

Boli Venerice

Maladiile transmisibile pe cale sexuală au în prezent o mare răspândire. Ele sunt în creștere și pentru faptul că unele dintre ele nu prezintă nici un simptom și persoana respectivă nu știe că este infectată, putând astfel transmite boala unei alte persoane cu care are contact sexual neprotejat.

Există numeroase boli cu transmitere sexuală:

- v Sifilis;
- v Blenoragia (gonoreea);
- v Trichomonioza urogenitală;
- v Candidozele;
- v Chlamidiaza;
- v Herpesul genital;
- v Verucile genitale;
- v Vaginita;
- v Paduchii latii;
- v Hepatita de tip B;
- v Infecții- **HIV-SIDA. BLENORAGIA**(gonoreea) La 3-5 zile de la raportul sexual infectat se produce îmbolnăvirea prin: Ț la barbat – apariția unei scurgeri purulente din canalul urinar; Ț la femeie – poate trece neobservată, manifestându-se uneori printr-o exagerare a unei secreții vaginale banale; Prezentarea la medic și tratarea bolii după indicațiile acestuia duc la vindecarea sigură și rapidă. În cazul când tratamentul se instituie prea târziu, apar complicații prin propagarea infecției la nivelul întregului aparat genitourinar. După ani de zile de la îmbolnăvire de blenoragie cu complicații, bolnavul poate avea o surpriză neplăcută – sterilitatea.

SIFILIS eziunea primară este sancrul sifilitic – o urmă nedureroasă apărută pe organul genital. Prezentarea de urgență la medic și tratarea bolii după prescripțiile medicului, duc la vindecarea sigură. În cazul când se întârzie prezentarea la medic infecția se răspândește în întreg organismul. Începe perioada secundară a sifilisului când pot apărea: Ț leziuni (sifilide) – pe tegumente, mucoase; Ț alopecii; Ț poliadenopatii. Dacă infecția sifilitică nu a fost surprinsă nici în perioada secundară ea continuă să evolueze fără nici un simptom. După 5 – 10 – 15 ani, apar manifestările sifilisului terțiar. Leziunile sunt gome și ulceratii care se pot localiza oriunde în organism: Ț piele, mucoase, oase; Ț creier și maduva spinării; Ț inimă, aorta; Ț globi oculari.

Îmbolnăvirea de o boală venerică este legată de felul în care fiecare om înțelege să-și rezolve problemele legate de sexualitate.

RETINETI !

1. Evitați sub orice formă legături sexuale întâmplătoare. Doar între soț și soție.
2. Pastrați o igienă desăvârșită a organului sexual.

3. Prezentați-vă la medic imediat ce ați observat primele semne de îmbolnăvire: sifilomul pentru sifilis sau scurgerea purulentă pentru blenoragie.
4. Nu vă tratați singuri la sfatul prietenilor.
5. Întrerupeți raporturile sexuale la cea mai mică suspiciune de îmbolnăvire.
6. În cazul îmbolnăvirii urmați tratamentul indicat până la vindecarea completă. Încercați să preveniți îmbolnăvirea prin măsuri de igienă: folosirea prezervativului, toaleta cu apă și săpun sau cu soluții slab antiseptice, a organelor genitale la sfârșitul actului sexual.